

表 1605 1セッションあたりの置換液量(L) 医療機関別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

医療機関	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)		1 (20.0)	4 (80.0)				5 (100.0)		5	5.80	2.86
私立大学 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)	2	3	6.00	
国立病院機構等 (%)											
県市町村立・国保 (%)		2 (8.3)	16 (66.7)	5 (20.8)		1 (4.2)	24 (100.0)		24	7.54	3.26
JCHO(旧社会保険)等 (%)			1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)		2	18.00	16.97
厚生連等 (%)			4 (28.6)	6 (42.9)		4 (28.6)	14 (100.0)	1	15	11.86	5.57
その他公的 (%)			9 (29.0)	21 (67.7)	1 (3.2)		31 (100.0)		31	9.55	1.61
私立総合 (%)				2 (66.7)		1 (33.3)	3 (100.0)		3	16.67	11.55
私立 (%)		32 (14.5)	61 (27.7)	81 (36.8)	4 (1.8)	42 (19.1)	220 (100.0)	9	229	11.70	7.32
私立診療所 (%)		18 (10.3)	50 (28.6)	56 (32.0)	7 (4.0)	44 (25.1)	175 (100.0)	14	189	13.61	9.49
総計 (%)		53 (11.2)	146 (30.7)	171 (36.0)	12 (2.5)	93 (19.6)	475 (100.0)	26	501	12.04	7.98

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1914##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査