

血糖降下薬一覧表 (※薬の使用にあたっては添付文書を参照のこと)

● 経口薬

(2016年4月現在)

分類	一般名	商品名 ^{注1)}	剤型・含有量	用法・用量 ^{注2)}
ビグアナイド薬	メトホルミン塩酸塩	グリコラン メトホルミン塩酸塩 ネルビス	錠 250mg 錠 250mg 錠 250mg	500～750mg/日 1日2～3回食後
		メトグルコ	錠 250, 500mg	500～1,500 (2,250) mg/日 1日2～3回食直前 または食後
	ブホルミン塩酸塩	ジベトス ジベトンS	錠 50mg 腸溶錠 50mg	50(100)～150mg/日 1日2～3回食後
チアゾリジン薬	ピオグリタゾン塩酸塩	アクトス アクトスOD ピオグリタゾン ピオグリタゾンOD	錠 15, 30mg 口腔内崩壊錠 15, 30mg 錠 15, 30mg 口腔内崩壊錠 15, 30mg	15～30(45) mg/日 1日1回朝食前または後
スルホニル尿素(SU)薬	アセトヘキサミド	ジメリン	錠 250, 500mg	250～500(1,000) mg/日 1日1～2回(朝, 夕) 食前または食後
	クロルプロパミド	アベマイド	錠 250mg	100～500mg/日 1日1回朝食前または朝食後
	グリクロピラミド	デアメリンS	錠 250mg	250～500mg/日 1日1～2回(朝, 夕) 食前または食後
	グリベンクラミド	オイグルコン ダオニール グリベンクラミド パミルコン マーグレイド	錠 1.25, 2.5mg 錠 1.25, 2.5mg 錠 1.25, 2.5mg 錠 1.25, 2.5mg 錠 1.25, 2.5mg	1.25～7.5(10) mg/日 1日1～2回(朝, 夕) 食前または食後
	グリクラジド	グリミクロン グリミクロンHA グリクラジド	錠 40mg 錠 20mg 錠 20, 40mg	40～120(160) mg/日 1日1～2回(朝, 夕) 食前または食後
	グリメビリド	アマリール アマリールOD グリメビリド グリメビリドOD	錠 0.5, 1, 3mg 口腔内崩壊錠 0.5, 1, 3mg 錠 0.5, 1, 3mg 口腔内崩壊錠 0.5, 1, 3mg	0.5～4(6) mg/日 1日1～2回(朝, 夕) 食前または食後
速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)	ナテグリニド	スターシス ファスティック	錠 30, 90mg 錠 30, 90mg	270(360) mg/日 1日3回食直前
	ミチグリニドカルシウム水和物	グルファスト	錠 5, 10mg	30(60) mg/日 1日3回食直前
	レバグリニド	シュアポスト	錠 0.25, 0.5mg	0.75～1.5(3) mg/日 1日3回食直前

分類	一般名	商品名 ^{注1)}	剤型・含有量	用法・用量 ^{注2)}
DPP-4阻害薬 ^{注3)}	▼ 1日1～2回			
	シタグリップチルリ ン酸塩水和物	グラクティブ ジャヌビア	錠12.5, 25, 50, 100mg 錠12.5, 25, 50, 100mg	50～100mg/日 1日1回
	ビルダグリップチル	エクア	錠50mg	100mg/日 1日2回(朝夕)
	アログリップチル安 息香酸塩	ネシーナ	錠6.25, 12.5, 25mg	25mg/日 1日1回
	リナグリップチル	トラゼンタ	錠5mg	5mg/日 1日1回
	テネリグリップチル 臭化水素酸塩水 和物	テネリア	錠20mg	20～40mg/日 1日1回
	アナグリップチル	スイニー	錠100mg	200～400mg/日 1日2回(朝夕)
	サキサグリップチ ン水和物	オングリザ	錠2.5, 5mg	5mg/日 1日1回
	▼ 週1回			
	トレラグリップチル コハク酸塩	ザファテック	錠50, 100mg	100mg/週 週1回
	オマリグリップチル	マリゼブ	錠12.5, 25mg	25mg/週 週1回
α-グルコシダーゼ阻害薬	アカルボース	グルコバイ グルコバイOD アカルボース アカルボースOD	錠50, 100mg 口腔内崩壊錠50, 100mg 錠50, 100mg 口腔内崩壊錠50, 100mg	150～300mg/日 1日3回食直前
	ボグリボース	ペイシン ペイシンOD ベグリラート ベグリラートOD ボグリボース ボグリボースOD ボグリボースODフィルム	錠0.2 ^{注4)} , 0.3mg 口腔内崩壊錠0.2 ^{注4)} , 0.3mg 錠0.2, 0.3mg 口腔内崩壊錠0.2, 0.3mg 錠0.2, 0.3mg 口腔内崩壊錠0.2, 0.3mg 口腔内崩壊フィルム0.2, 0.3mg	0.6～0.9mg/日 1日3回食直前
	ミグリトール	セイブル セイブルOD	錠25, 50, 75mg 口腔内崩壊錠50, 75mg	150～225mg/日 1日3回食直前

分類	一般名	商品名 ^{注1)}	剤型・含有量	用法・用量 ^{注2)}
SGLT2阻害薬	イプラグリフロジンL-プロリン	スーグラ	錠 25, 50mg	50(100)mg/日 朝食前または朝食後
	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	フォシーガ	錠5, 10mg	5(10)mg/日 1日1回
	ルセオグリフロジン水和物	ルセフィ	錠 2.5, 5mg	2.5(5)mg/日 朝食前または朝食後
	トホグリフロジン水和物	アブルウェイデベルザ	錠 20mg 錠 20mg	20mg/日 朝食前または朝食後
	カナグリフロジン水和物	カナグル	錠 100mg	100mg/日 朝食前または朝食後
	エンパグリフロジン	ジャディアンス	錠 10, 25mg	10(25)mg/日 朝食前または朝食後
配合薬	ピオグリタゾン塩酸塩／メトホルミン塩酸塩	メタクト配合錠LD メタクト配合錠HD	錠 15/500mg 錠 30/500mg	[15/500mg]/日 [30/500mg]/日 朝食後
	ピオグリタゾン塩酸塩／グリメピリド	ソニアス配合錠LD ソニアス配合錠HD	錠 15/1mg 錠 30/3mg	[15/1mg]/日 [30/3mg]/日 朝食前または朝食後
	アログリブチン安息香酸塩／ピオグリタゾン塩酸塩	リオベル配合錠LD リオベル配合錠HD	錠 25/15mg 錠 25/30mg	[25/15mg]/日 [25/30mg]/日 朝食前または朝食後
	ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース	グルベス配合錠	錠 10/0.2mg	[30/0.6mg]/日 1日3回食直前
	ビルダグリブチン／メトホルミン塩酸塩	エクメット配合錠LD エクメット配合錠HD	錠 50/250mg 錠 50/500mg	[100/500mg]/日 [100/1,000mg]/日 1日2回(朝夕)

注1) 商品名の太字は本文中に記載したもの。

注2) 用量は常用量を記載したが、最高投与量が異なるときは()内に示した。

注3) リナグリブチン、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物以外のDPP-4阻害薬は、腎症がある場合には適宜、添付文書に従つて減量すること。

注4) 一部の耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制に使用できる。ただし、その際の用量は0.6mg/日とする。

● 注射薬

分類	一般名	商品名	剤型・ 1筒中の含有量	用法・用量
GLP-1受容体作動薬	▼ 1日1～2回			
	リラグルチド (遺伝子組換え)	ピクトーザ皮下注18mg	皮下注18mg	0.9mg/日 1日1回
	エキセナチド	バイエッタ皮下注5μgペン300 バイエッタ皮下注10μgペン300	皮下注300μg	10～20μg/日 1日2回, 朝夕食前
	リキシセナチド	リキスマ皮下注300μg	300μg	10～20μg/日 1日1回, 朝食前
	▼ 週1回			
	エキセナチド (持続性注射剤)	ビデュリオン皮下注用2mg	2.6mg	2mg/週 ^{注1)} , 週1回
	エキセナチド (持続性注射剤)	ビデュリオン皮下注用2mgペン	2.76mg	2mg/週 ^{注2)} , 週1回
	デュラグルチド (遺伝子組換え)	トルリシティ皮下注0.75mg アテオス	0.75mg	0.75mg/週, 週1回

注1) 本剤1/バイアルに添付専用懸濁用液を加え懸濁した薬液を投与する場合、投与される薬液はエキセナチドとして2mgを含む。

注2) 本剤1キットを投与する場合、投与される薬液はエキセナチドとして2mgを含む。