

輸液・静脈栄養のお話

新潟大学消化器・一般外科

小山 諭

輸液とは

静脈内に液体を
投与すること

輸液の目的

経口・経腸では
足りないものを
仕方なく 補う

輸液で補うもの・目的

水・電解質バランス

栄養素

水・電解質液

- 1) 細胞外液補充液--- Na^+ の濃度が細胞外液に近い (約 140 mEq/l)
ラクテック、Veen D、生理食塩水など
- 2) 開始液--- Na^+ の濃度が生理食塩水の半分強 (約 90 mEq/l)
いわゆる1号液
- 3) 脱水補給液---開始液に K^+ を添加
いわゆる2号液
- 4) 維持液--- Na^+ の濃度が生理食塩水の $1/3 \sim 1/4$ (35 ~ 50 mEq/l)
いわゆる3号液
- 5) 術後回復液---維持液の K^+ 濃度を下げたもの
いわゆる4号液

血管内に投与しても安全な液は？

- ・ 生理食塩水 (0.9%NaCl)

電解質濃度により等張液と低張液に分ける

等張液：電解質濃度 $\equiv$ 正常血清浸透圧

低張液：電解質濃度 $<$ 正常血清浸透圧

- ・ 5%グルコース液

電解質を全く含まずに血清浸透圧と等張

生理食塩水 (0.9%NaCl) だけ輸液した場合は？


問題点 1

1000mlでNaCl 9g
2000mlでNaCl 18g





NaCl過剰！！！！

問題点2 NaとClが等量 (154mEq/L)




Clが過剰




アシドーシス！

ラクテックなどは

生食: 154 mEq/L
= 140 mEq/L x 1.1



ラクテック, VeenF



ソリタ T 3 とは

生食 500ml
NaCl 4.5g

+

5% グルコース
500ml

5% グルコース
500ml

5% グルコース
500ml

=

ソリタ T 3 2000ml

Na 70mEq (35mEq/L)


Cl 70mEq (35mEq/L)

+

K 40mEq (20mEq/L)


"輸液"の発展

- 1616 年 血液循環の概念 (William Harvey)
- 1666年 動物-ヒト間輸血 (Richard Lower)
- 1667年 ヒトへの静注 (J. D. Major)
- 1818年 ヒト-ヒト間輸血 (James Blundell)
- 1831年 コレラ患者への輸液 (Thomas Latta)
- 1843年 動物への糖質静注 (Claude Bernard)
- 1873年 コレラ患者へのミルクの静注 (Edward Hodder)
- 1887年 術後患者にグルコース静注 (Albert Lander)



高カロリー輸液の発展

- 1911年 5%, 10%グルコース輸液 (Kausch)
- 1915年 イヌへの脂肪乳剤静注 (Murlin & Riche)
- 1937年 必須アミノ酸組成 (William Rose)
- 1945年 糖質・蛋白・脂質の静脈投与 (McKibbin)
- 1952年 鎖骨下静脈穿刺法 (Aubaniac)
- 1959年 非蛋白カロリー/窒素比 (F Moore)
- 1967年 イヌのTPN (SJ Dudrick)
- 1968年 新生児のTPN (DW Wilmore)



世界最初の静脈内注液の図

(Glasgow, 1845)

蛋白喪失の影響

健常時 100%

筋肉量減少：骨格筋、心筋、？平滑筋

内臓蛋白減少：アルブミン、トランスフェリン、輸送蛋白

免疫能障害：リンパ球、多核白血球、補体、
抗体、急性相蛋白


除脂肪組織量
(lean body mass)

創傷治癒遅延：外傷への反応


臓器障害：腸、肝、心

生体適応の障害

Nitrogen death 70%



累積エネルギーバランスと末梢血中総リンパ球数



－1985年計測(20年前)－

ある病棟での風景

Aさん (54才、男性)は腹痛で1週間前に入院された。

入院時 身長 165 cm, 体重 50 kg

禁食で1週間末梢輸液が行われている。

ソリタ3号 4本 : 2000 ml (1本にネオラ3B 1A入っている)

これはOKですか？

ソリタ 3号 : **グルコース 4.3%**

Na 35 mEq/l

K 20 mEq/l

Cl 35 mEq/l

乳酸 20 mEq/l

1000 mlでは **グルコース 43g** ➡ **172 kcal**

Na 35 mEq

K 20 mEq

2000 mlでは **グルコース 86 g** ➡ **344 kcal**

Na 35 mEq

K 20 mEq

患者さんは
点滴して栄養がついていると思っているが・・・

ソリタ 3 号は栄養輸液ではありません。

わずかな グルコースと
電解質
しか含まれていない！

ソリタと同様の輸液製剤

ソリタ 1号：ソルデム 1号、KN1A、KN1Bなど

ソリタ 2号：ソルデム 2号、KN2A、KN2Bなど

ソリタ 3号：ソルデム 3号、ソルデム 4号、フィジオ35、
アクチット、KN3A、KN3Bなど

ソリタ 4号：ソルデム 5号、KN4A、KN4Bなど

例えば

ソリタ 3号 1000 ml + アクチット 500 ml + ラクテック 500 ml



272 kcalしかありません！

では アミノフリード 1000 ml では？

アミノフリード：グルコース 7.5 %

Na 35 mEq/l

K 20 mEq/l

アミノ酸 3.0 %

1000 ml :	グルコース 75 g	→	300 kcal	} 420 kcal
	アミノ酸 30 g	→	120 kcal	

2000 ml :	グルコース 150 g	→	240 kcal	} 840 kcal
	アミノ酸 60 g	→	600 kcal	

これで十分なの？？？

50 kg x 30 kcal/kgとすると

1500 kcal 必要！

アミノフリードだけでは

カロリーが $1500 - 840 = 660$ kcal 足りない！

アミノ酸（蛋白質）は $1.0 \text{ g/kg} \times 50 \text{ kg} = 50 \text{ g}$ 必要とすると、
60 g なので足りている。

足りない約600 kcalをどうするか??

これが10日間続けば、 $660 \text{ kcal/日} \times 10 \text{ 日}$

= 6600 kcalの赤字！！！！

A. 必要エネルギー:

1) 基礎エネルギー消費量 (basal energy expenditure: BEE)

Harris-Benedictの式 (kcal/day)

$$\text{BEE (男性)} = 66.5 + (13.7 \times \text{Wt}) + (5 \times \text{Ht}) - (6.8 \times \text{A})$$

$$\text{BEE (女性)} = 665 + (9.6 \times \text{Wt}) + (1.7 \times \text{Ht}) - (4.7 \times \text{A})$$

Wt: Weight (kg) Ht: Height (cm) A: Age (years)

総エネルギー消費量 (total energy expenditure: TEE)

$$= \text{BEE} \times \text{ストレス因子 (傷害因子)} \times \text{活動因子}$$

ストレス因子

低侵襲	1.0
中等度侵襲	1.2 ~ 1.3
高度侵襲	1.3 ~ 1.5

活動因子

寝たきり	1.1
ベッド上安静	1.2
歩行	1.3

2) 概算: 25 ~ 30 kcal/kg x 体重

B. 蛋白質 (アミノ酸) 必要量の算出

蛋白質 (アミノ酸) 必要量 (g/day) =

健常時 0.8 ~ 1.0

侵襲時

軽 度 1.1 ~ 1.3 (g/kg) x 体重 (kg)

中等度 1.3 ~ 1.5

高 度 1.5 ~ 2.0

C. 脂質投与量の決定

脂質投与量 = TEE の 20 ~ 30%

D. 糖質投与量の決定

糖質 (グルコース) 投与量

= TEE - (アミノ酸投与カロリー) - (脂質投与カロリー)

水分

30 ~ 40 ml/kg x 体重

電解質

Na: 2 ~ 3 mEq/kg、


100 ~ 260 mEq/日

K : 1 ~ 2 mEq/kg、

60 ~ 120 mEq/日

Cl : 2 ~ 3 mEq/kg

栄養源の内訳



ちなみに先ほどの患者さんを
Harris-Benedictの式 (kcal/day)
で計算してみると・・・

$$\begin{aligned}\text{BEE (男性)} &= 66.5 + (13.7 \times \text{Wt}) + (5 \times \text{Ht}) - (6.8 \times \text{A}) \\ &= 66.5 + (13.7 \times 50) + (5 \times 165) - (6.8 \times 54) \\ &= 66.5 + 685 + 825 - 367.2 \\ &= 1209.3 \text{ kcal}\end{aligned}$$

活動係数 1.3 ストレス係数 1.1 となると

$$\begin{aligned}\text{TEE (男性)} &= 1209.3 \times 1.3 \times 1.1 \\ &= 1729.299 \text{ kcal}\end{aligned}$$

が必要！

糖 質:

グルコース

最低100~150 g/日は必要

非蛋白カロリーの60-70 %

投与速度: 5 mg/kg/min 以下

グルコース 1 g → 4 kcal

蛋白（アミノ酸）

0.8 ~ 2.0 g/kg/日

総投与カロリーの20 %

非蛋白カロリー/N 比 : 150

アミノ酸 1 g → 4 kcal

演習問題

(1) 70%グルコース1000 ml中に

グルコースは _____ g、従って _____ x _____ = _____ kcal

(2) アミゼット10 (10%アミノ酸液) 400 ml中に

アミノ酸は _____ g、従って _____ x _____ = _____ kcal

(3) PNツイン1号：1000 ml中にグルコース120 gとアミノ酸20 g

グルコースは _____ x _____ = _____ kcal

アミノ酸は _____ x _____ = _____ kcal

したがって、合計 _____ + _____ = _____ kcal

？素朴な疑問？

Question 1----どんな人でも同じ内容でいいの？

40才、男性、身長170cm、体重70kg

80才、女性、身長145cm、体重40kg

Question 2----どんな状態でも同じカロリーでいいの？

40才、男性、身長170cm、体重70kg、重傷交通外傷

80才、女性、身長145cm、体重40kg、内科疾患

Question 3----栄養素の組成はこれでいいの？

グルコース

アミノ酸

etc

必要カロリーの面から

40才、男性、身長170cm、体重70kg、重傷交通外傷

BEE = 1603.5 kcal、活動係数 1.1、ストレス係数 1.5 とすると

TEE = 1603.5 x 1.1 x 1.5 = **2647 kcal**

80才、女性、身長145cm、体重40kg、内科疾患

BEE = 910 kcal、活動係数 1.3、ストレス係数 1.1 とすると

TEE = 910 x 1.3 x 1.1 = **1301 kcal**

アミノ酸必要量の面から

40才、男性、身長170cm、体重70kg、重傷交通外傷

アミノ酸必要量 1.5 g/kg/日とすると

$$\begin{aligned} & 1.5 \text{ (g/kg /日)} \times 70 \text{ (kg)} \\ & = \mathbf{105 \text{ g /日 (420 kcal)}} \end{aligned}$$

80才、女性、身長145cm、体重40kg、内科疾患

アミノ酸必要量 1.2 g/kg/日とすると

$$\begin{aligned} & 1.2 \text{ (g/kg /日)} \times 40 \text{ (kg)} \\ & = \mathbf{48 \text{ g /日 (192 kcal)}} \end{aligned}$$

耐糖能の面から

40才、男性、身長170cm、体重70kg、重傷交通外傷

グルコース許容量 4 mg/kg/min とすると

$$\begin{aligned} & 4 \text{ (mg/kg/min)} \times 70 \text{ (kg)} \times 60 \text{ (min)} \times 24 \text{ (hr)} \\ &= 403000 \text{ mg} \\ &= \mathbf{403 \text{ g}} \end{aligned}$$

80才、女性、身長145cm、体重40kg、内科疾患

グルコース許容量 5 mg/kg/min とすると

$$\begin{aligned} & 5 \text{ (mg/kg/min)} \times 40 \text{ (kg)} \times 60 \text{ (min)} \times 24 \text{ (hr)} \\ &= 288000 \text{ mg} \\ &= \mathbf{288 \text{ g}} \end{aligned}$$

栄養素のバランスの面から

A社キット製剤 2000ml

総カロリー：1640 kcal

グルコース：1400 kcal (350 g) 85 %

アミノ酸：240 kcal (60 g) 15 %

脂肪が全然入りません!!!

我々が普段の食生活で、

脂肪を全く取らない日はありますか？

高カロリーキット製剤	〇〇1号	〇〇2号	〇〇3号
------------	------	------	------

総量	(ml)	1000	1100	1200
グルコース	(g)	120	180	250
アミノ酸	(g)	20	30	40

アミノ酸製剤	10%	12%
--------	-----	-----

アミノ酸	(g/100 ml)	10	12
------	------------	----	----

40才、男性、身長170cm、体重70kg、重傷交通外傷の場合

BEE = 1603.5 kcal、活動係数 1.1、ストレス係数 1.5 とすると

TEE = $1603.5 \times 1.1 \times 1.5 = 2647$ kcal、アミノ酸必要量 (1.5 g/kg/日)

アミノ酸 → 420 kcal → 105 g → 16 %

脂肪 → 600 kcal → 20% イントラ3本 → 23 %

グルコース → 1530 kcal → 383 g → 59 %

〇〇1号 + 〇〇3号 (総量 2200 ml、グルコース 370 g、アミノ酸 60 g)

+

10 %アミノ酸製剤 450 ml (アミノ酸 45 g)

+

20% イントラ 300 ml (100 ml x 3 本)

NPC/N比 = 2103/ (105/6.25)

=127

80才、女性、身長145cm、体重40kg、内科疾患の場合

BEE = 910 kcal、活動係数 1.3、ストレス係数 1.1 とすると
TEE = 1301 kcal、アミノ酸必要量 (1.2 g/kg/日)

アミノ酸 → 192 kcal → 48 g → 7 %
脂肪 → 390 kcal → 20% イントラ2本 → 30 %
グルコース → 818 kcal → 204 g → 63 %

〇〇3号 (総量 1200 ml、グルコース 250 g、アミノ酸 40 g)

+

10 %アミノ酸製剤 200 ml (アミノ酸 20 g)

+

20% イントラ 200 ml (100 ml x 2 本)

グルコースを204g入れるためには、
1400ml

$$\begin{aligned} & \times 204/250 \\ & = 1142 \text{ ml} \\ & (47.6 \text{ ml/hr}) \end{aligned}$$

この時に入るアミノ酸は、
 $60 \times 204/250$
 $= 49 \text{ g}$

$$\text{NPC/N比} = 1208 / (49/6.25) = 154$$